

Cuadro 8.1
PICHINCHA Y QUITO: DESEO DE USAR ANTICONCEPTIVOS EN EL
PRESENTE O EN EL FUTURO Y CONOCIMIENTO DE FUENTE,
SEGÚN EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Mujeres casadas o unidas no usuarias y sin problemas de fertilidad

| EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN | DESEO DE USAR | | | | | | CONOCE FUENTE (*) | |
|--------------------------------|---------------|--------|----------|---------|-------|-------------|-------------------|-------------|
| | Presente | Futuro | No desea | No sabe | Total | Nº de casos | % | Nº de casos |
| PICHINCHA | | | | | | | | |
| TOTAL | 10.2 | 43.7 | 43.0 | 3.1 | 100.0 | 223 | 83.2 | 109 |
| Edad actual (años) | | | | | | | | |
| Menos de 30 | 15.8 | 68.3 | 12.5 | 3.4 | 100.0 | 103 | 81.0 | 68 |
| 30 - 49 | 6.1 | 25.6 | 65.2 | 3.1 | 100.0 | 120 | 87.0 | 41 |
| Nivel de instrucción | | | | | | | | |
| Ninguno/Primario | 17.9 | 32.8 | 46.3 | 3.0 | 100.0 | 104 | 78.2 | 49 |
| Secundario/Superior | 3.3 | 53.3 | 40.0 | 3.4 | 100.0 | 119 | 87.1 | 60 |
| QUITO | | | | | | | | |
| TOTAL | 6.9 | 45.8 | 45.8 | 1.5 | 100.0 | 117 | 83.1 | 57 |
| Edad actual (años) | | | | | | | | |
| Menos de 30 | 13.7 | 76.5 | 7.8 | 2.0 | 100.0 | 47 | 77.1 | 31 |
| 30 - 49 | 3.2 | 29.0 | 66.7 | 1.1 | 100.0 | 70 | 90.0 | 26 |
| Nivel de instrucción | | | | | | | | |
| Ninguno/Primario | 15.7 | 27.5 | 54.9 | 1.9 | 100.0 | 41 | * | 17 |
| Secundario/Superior | 2.2 | 55.9 | 40.9 | 1.0 | 100.0 | 76 | 84.8 | 40 |

(*) Se refiere a los casos que desean usar anticonceptivos

* Menos de 25 casos

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 8.2
**PICHINCHA Y QUITO: FUENTE A DONDE IRÍA PARA OBTENER
 EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO PREFERIDO**
 Mujeres casadas o unidas no usuarias, desean usar y
 conocen fuente (Distribución porcentual)

| FUENTE DONDE IRÍA | PICHINCHA | QUITO |
|--------------------------|--------------|--------------|
| MSP | 50.0 | 46.3 |
| IESS | 1.9 | 1.9 |
| ONG's (*) | 20.2 | 20.4 |
| Clínica o médico privado | 12.5 | 14.8 |
| Farmacia | 12.5 | 13.0 |
| Otra (**) | 1.9 | 3.7 |
| No sabe/no responde | 1.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |
| Nº de casos | 91 | 48 |

(*) APROFE, CEMOPLAF, COF

(**) Incluye FF.AA., Policía, Junta de Beneficencia, Patronato San José, partera, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 8.3
PICHINCHA Y QUITO: MUJERES QUE NECESITAN SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR*, SEGÚN EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Mujeres de 15 a 49 años de edad (Porcentajes)

| EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION | PAÍS | | PICHINCHA | | QUITO | |
|--------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| | % | Nº casos | % | Nº casos | % | Nº casos |
| Total | 5.0 | 10814 | 4.2 | 1480 | 3.1 | 871 |
| Edad actual (años) | | | | | | |
| Menos de 30 | 4.8 | 5419 | 3.3 | 766 | 2.3 | 436 |
| 30 - 49 | 6.2 | 5395 | 5.4 | 714 | 3.9 | 435 |
| Nivel de instrucción | | | | | | |
| Ninguno/Primario | 8.7 | 4770 | 6.9 | 470 | 4.8 | 198 |
| Secundario/Superior | 3.4 | 6044 | 3.0 | 1010 | 2.6 | 673 |

* Mujeres que no reportaron problemas de subfertilidad, no están embarazadas, activas sexualmente y no están usando métodos anticonceptivos.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004