

## 11. MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

### 11.1 Niveles de mortalidad infantil y en la niñez (Cuadro 11.1)

- La tasa de mortalidad infantil estimada a nivel nacional para el período 1994-2004 es de 32 muertes por cada mil nacidos vivos y para el período 1989-1999 se estimó en 33 muertes, lo que significa el descenso de solo una muerte entre estos dos periodos, lo cual debe conducir a un profundo análisis de las estrategias de intervención orientadas a su prevención.
- El cálculo de la mortalidad infantil de Guayas y de Guayaquil, para el período 1994-2004, es de 26 defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos, nivel más alto al encontrado para el período 1989-1999 que fue de 18 por mil n.v. Debe tomarse en consideración que estos resultados no previstos y hasta contradictorios, tanto en los niveles como en su tendencia, pueden deberse principalmente a bajo número de casos necesarios para la construcción del indicador. Además, se hace necesario aclarar que la mortalidad, al igual que otras variables demográficas, medidas a través de encuestas, está sujeta a errores de declaración, en términos de omisión de hijos que han fallecido al poco tiempo de nacer, a la calidad diferencial de la declaración de las fechas de nacimiento de hijos sobrevivientes e hijos muertos, y la declaración errónea de la edad al morir o de la fecha de defunción del hijo, aspectos que ameritan un estudio a profundidad.
- La probabilidad de muerte entre el primer año y antes de cumplir los cuatro años (mortalidad en la niñez) se estabiliza y para el período 1994-2004 para Guayas es de 4 por mil nacidos vivos, igual al registrado para el período 1989-1999 y que a nivel nacional (5 por mil).