

12. NUTRICION EN MENORES DE 5 AÑOS

12.1 Indicadores antropométricos (Cuadro 12.1 y Gráfico 12.1)

- Dado que el estado nutricional de los niños está estrechamente asociado a su morbilidad y mortalidad, por primera vez en la ENDEMAIN-2004 se incluyó un módulo de antropometría, en el cual se obtuvo el peso y la talla de las madres y de sus niños(as) nacidos(as) a partir de enero de 1999. Los indicadores antropométricos para cada niño(a) fueron calculados con la población de referencia internacional de NCHS/CDC/OMS.
- A nivel provincial, el 28 por ciento de los niños(as) menores de cinco años de edad presenta desnutrición crónica o retardo en el crecimiento (baja talla para edad). Sobre este nivel, los indicadores más altos y preocupantes de desnutrición crónica se encuentran entre los(as) hijos(as) de mujeres con bajos niveles de instrucción (37%) y de aquellas clasificadas en los quintiles económicos más pobres (entre el 28% y 37%). Así mismo, excepto los niños(as) menores a un año, el grado de desnutrición no tiene mayores diferencias en las demás edades; tampoco existen mayores diferencias según el sexo de los niños(as). En el caso de Quito, el grado de desnutrición es mayor que a nivel provincial (30%) y con similares diferenciales con respecto a las variables analizadas para la provincia, aunque con niveles un poco más altos.
- Otros dos indicadores de desnutrición incluyen el porcentaje de niños(as) con bajo peso para la edad y bajo peso para la talla. El primero de estos indicadores se ha estimado a nivel provincial en el 7.9 por ciento y el segundo en 0.8 por ciento (8.5% y 1.0% para Quito, respectivamente).

Gráfico 12.1
Pichincha: Prevalencia de desnutrición crónica (talla para edad)
en menores de 5 años, según nivel de instrucción y quintil económico

